


Cáncer de la orofaringe, en detalle

VPH: ¿QUÉ ES?

- El Virus del Papiloma Humano (VPH) es la infección de transmisión sexual más común, se adquiere con el contacto de piel con piel, y afecta predominantemente la piel y las mucosas.
- Existen más de 200 genotipos de este.
- Se manifiesta a través de verrugas benignas (como los genotipos 6 y 11) o puede causar lesiones cancerígenas en el cuello uterino (16 y 18).
- También se relaciona con otros tumores menos frecuentes como el anal y el orofaríngeo.



CAVIDAD ORAL Y LA OROFARINGUE

El VPH se puede encontrar distribuido tanto en la cavidad oral como en la orofaringe. Pero cuando el VPH causa cáncer se origina más comúnmente en la orofaringe.

Cáncer de la cavidad oral puede afectar: lengua, el cielo de la boca o paladar, piso de la boca, encías, carrillos o cachetes.

Cáncer de la orofaringe puede afectar: amígdalas, fosas amigdalinas, base de la lengua, paladar blando o velo del paladar.

La faringe (garganta) comprende tres regiones:

1. Nasofaringe: situada detrás de la cavidad nasal
2. Orofaringe: situada en la parte media de la faringe
3. Hipofaringe: situada en la parte inferior de la faringe que se extiende hasta justo por encima de la laringe (donde están las cuerdas vocales)

TRES FACTORES DE RIESGO DEL CÁNCER DE OROFARINGE


1. Presencia de VPH de alto riesgo
2. Tabaquismo
3. Consumo de alcohol



¿SE PUEDE PREVENIR?

Existen dos vacunas (Cervarix y Gardasil) que previenen la infección con algunos tipos de VPH, las cuales están aprobadas para prevenir lesiones precancerosas y cáncer del cuello uterino, vagina y vulva. La vacuna tetravalente (Gardasil) también está indicada para prevenir los condilomas acuminados y el cáncer anal. No se han aprobado para prevenir el cáncer orofaríngeo, pero estudios indican que podría reducir el riesgo.

+infografía La Prensa-Daniel González +fuente Datos propios



PANAMÁ

El Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud cuenta con la vacuna Cervarix (que protege contra los genotipos 16 y 18 del VPH) para niñas 10 años.

Para que sea efectiva, la vacuna de VPH se debe aplicar en tres dosis: la segunda dos meses después de la primera y la tercera dosis a los seis meses de la primera.